



Como proteger la salud de su bandada

- Mantenga a las personas no necesarias alejadas de su granja y afuera de sus corrales
 - Cierre con llave las puertas
 - Use cercas y carteles para mantener la gente afuera
- No permita visitantes adentro o cerca de los corrales
- Cultivadores y empleados deben mantener su ropa (incluyendo zapatos, botas, gorro y guantes) separada de aquella ropa usada fuera de la granja.
 - Se sugiere tener un par de botas en cada corral y que sean usadas solo en ese mismo corral
- Nunca visite otra granja productora de aves
 - Empleados no deben tener aves en sus casas
- Después del trabajo, cambie su ropa completamente y lávese las manos y brazos antes de ir a casa
- Cazadores y otras personas que entran en contacto con aves salvajes deben cambiar su ropa (y zapatos) y bañarse antes de regresar a sus trabajos. Esto es especialmente importante cuando se está en contacto con aves acuáticas.
- Mantenga aves acuáticas y alimaña afuera de los corrales
 - Mantenga las puertas cerradas entre cada bandada
 - Tenga un buen programa de control de insectos y roedores
 - Realice el mantenimiento de la vegetación y no tenga desechos/escombros cerca de los corrales
 - Limpie derrames de comida
- Visitantes esenciales tienen que usar ropa de seguridad, incluyendo botas y gorro, antes de ser permitido cerca de las aves
 - Mantenga ropa de seguridad a mano para cuando se necesite en caso de problemas
 - Tenga un lugar específico para desechar la ropa de seguridad usada.
- Monitoree quien viene a la granja
- Limpie y desinfecte toda herramienta antes y después de ser usada en la granja
- Saque y deseche adecuadamente a las aves muertas
 - Una eliminación inadecuada de las aves muertas puede causar enfermedades, al igual que atraer moscas y carroñeros
- Cultivadores deben contactar a su supervisor inmediatamente si se está experimentando un número elevado de mortalidades
 - Aves enfermas o moribundas deben ser mandadas a un laboratorio del estado para ser diagnosticadas
 - No visite otras granjas o lugares donde los cultivadores frecuentan si se está experimentando un número elevado de mortalidades